(C) SRPV, 1994. Toute reproduction, même partielle.

ISSN 0757-4037

CPPAP Nº 1701 AD .

"CENTRE" - Le Directeur-Gérant : M. HANRION :

AVERTISSEMENTS AGRICOLE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

REGION CENTRE

Bulletin n° 31 du 07/11/96

COLZA

Stade: «4 feuilles» à «formation de la rosette».

Edition

ultures Spéciales

Suivi phoma


De nouvelles projections ont eu lieu sur les pièges de Bagneux (36), Oizon (18), Illiers Combray (28), Fleury les Aubrais (45), Chatillon Coligny (45) avec des pics très importants pour ces deux pièges situés dans le Loiret. Pas de projection significative à Ignol (18), Trouy (18), Châteauneuf en Thymerais (28), Brion (36), Le Louroux (37) et Selommes (41).

■Quelques parcelles sont encore au stade sensible. Rappel des situations à risque : sols limoneux (limons argileux ou argilo-limo-

neux) où les levées sont difficiles; les variétés sensibles (Bristol et Synergy) n'ayant pas encore atteint le stade «6 feuilles» et les variétés moyennement sensibles (Aligator, Coktail, Mohican, Akamer et Goéland) quin'ont pas atteint le stade «4 feuilles» sont à protéger avec Eria à 2 Uha ou Impact R à 1,25 Uha.

pouvoir virulifère chute également : 10 % seulement des pots pièges exposés aux arrivées de pucerons la semaine passée montrent la présence de virus : 0 % de puceron virulifère parmi les pucerons piégés à la tour cette semaine. Les comptages au champ montrent très peu de parcelles au scuil d'intervention (10 % de pieds porteurs) : les parcelles présentant des pucerons sont principalement les semis précoces à «3 feuilles» ou «début tallage» actuellement, les levées pointantes ou à «1-2 feuil.» présentent très peu de pucerons :

- Cher: 16 et 22 % à Méry es Bois (blé début tallage déjà traité), 0 à 5 % dans le secteur de Oizon.
- Eure et Loir : 0 % à Allaines (blé pointant), 0 % à Viabon (blé à 1-2 feuilles), 0 % à Fains la Folie (blé pointant), 0 % à Auffains (blé à 2



CEREALES

Stade: Levée à début tallage.

Pucerons

Les captures continuent à chuter à la tour à succion. La colonisation des pots pièges est passée de 79 à 30 % de pieds porteurs. Le

feuilles), 0 % à Baignelet (blé pointant), 4 % à Cormainville (bléà 2 feuilles), 0 % à Varize (blé à 2 feuilles), 0 % à Puerthe (orge à 1 feuille), 0 % à Dessainville (blé à 2 feuilles).

- Indre et Loire : 5 % à Cussay (blé à 1 feuille), 20 % à Richelieu (blé à 3 feuilles), 0 % à Autrèche (blé à 1 feuille), 0 % à Crotelles (blé à 3 feuilles), 0 % à Beaumont la Ronce (blé à 1

Dates	% de pots porteurs de Rhopalosiphum padi		Nombre de R. padi moyen/plante touchée		% de pots positifs au test ELISA	
	1996	1995	1996	1995	1996	1995
01/10 au 08/10		89,00%	3,30	2,10	35,00%	45,00%
08/10 au 15/10	100,00%	100,00%	3,50	12,00	25,00%	81,00%
15/10 au 22/10	100,00%	100,00%	4,00	3,60	23,00%	28,00%
22/10 au 29/10	78,80%	100,00%	2,50	3,30	10,00%	13,00%
29/10 au 05/11	30,00%	6,00%	1,80	1,30	à venir	26,00%

direction régionale de l'agriculture et de la forêt

ARBORICULTURE : 260 F : 230 F VITICULTURE CULTURES LEGUMIERES : 230 F

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX CENTRE 93, rue de Curambourg - BP 210 - 45403 FLEURY LES AUBRAIS Cédex Tél. 38.22.11.11 - Fax 38.84.19.79

P42

ques sinations à risque à protéger.

CEREALES:

Pucerons: Peu d'arrivées nouvelles en cultures. Restez vigilants.

COLZA: Suivi phoma:

De nouvelles projec-

tions. Encore quel-

Cicadelles: Chute des

captures.



